

...

HEPATITAS B


ATMINTINĖ GYDYTOJAMS

JUMS REIKIA ŽINOTI

...

AR JŪS NAUDOJATĖS VEIKSMINGOMIS APSAUGOS NUO
VIRUSINIO HEPATITO B PRIEMONĖMIS?

SUŽINOKITĖ! PASISKIEPYKITE! APSISAUGOKITE!



ATMINKITE

Hepatitis B

Hepatito B virusas sukelia ūminį kepenų uždegimą (hepatitą), kartais žaibišką kepenų nepakankumą, lėtinę hepatito B infekciją - (HBs Ag (+)) nešiojimą bei komplikacijas.

- Hepatitas B plinta ir kaip
- hospitalinė infekcija,
- perduodama per adatas
- ar kitus užkrėstus
- instrumentus.

- Lėtinė hepatito B
- infekcija gali sąlygoti
- kepenų vėžio
- išsivystymą.



VISAME PASAULYJE

nuo hepatito B kenčia apie **2** milijardai žmonių. Skaičiuojama, kad infekcija sąlygoja apie **600** tūkstančių mirčių.

KUR IR KAIP GALIU PASISKIEPYTI NUO HEPATITO B?

**VAKCINOJE
PRIEŠ VIRUSINĮ
GEPATITĄ B**

Vakcina prieš hepatitą B yra rekombinuota DNR vakcina ir skiepijimo kursas yra 3 dozės. Skiepijimo schema: 0, 1, 6 (0, 1 ir 6 mėnesį) į raumenis.

Paskiepijus trimis vakcinų dozėmis po 1-2 mėnesių sveikatos priežiūros darbuotojams rekomenduojama patikrinti imuninį atsaką (antikūnus (Anti-HBs) kiekį prieš hepatito B paviršinius antigenus:

- Anti-HBs >10mIU/mL: įgytas imunitetas
- Anti-HBs <10mIU/mL: pakartoti 3 dozių skiepijimo kursą ir po 1-2 mėnesių vėl patikrinti antikūnų atsaką:
- Jei Anti-HBs >10mIU/mL: įgytas imunitetas
- Jei Anti-HBs <10mIU/mL: nėra atsako.

Apsauga trunka ne trumpiau kaip 20 metų; galbūt ir ilgiau.



KAM REKOMENDUOJAMA PASISKIEPYTI NUO HEPATITO B?

- | **Sveikatos priežiūros darbuotojams** reikia pasiskiepyti nuo hepatito B, jei darbe yra rizika užsikrėsti hepatito B virusu.
- | **Sveikatos priežiūros darbuotojai**, kurie nėra skiepyti ir turėjo ekspoziciją (sužeidimai, sąlytis su infekcijos šaltiniu), kaip įmanoma greičiau po ekspozicijos turi gauti pirmąją vakcinos dozę (poekspozicinė imunoprofilaktika).
- | Asmenims, kurių bent vienas iš šeimos narių yra hepatito B viruso nešiotojas.
- | Keliaujantiems į endemines hepatito B šalis.
- | Visiems suaugusiems, neturintiems imuniteto prieš hepatitą B.

HEPATITO B VAKCINOS EFEKTYVUMAS



Trijų dozių kurso efektyvumas užtikrina 95 proc. apsaugą nuo hepatito B infekcijos ir komplikacijų.

TRUMPAI APIE LIGĄ

Hepatitis B išlieka dažna infekcija ES šalyse, sergamumas siekia 3,45 atvejo 100 tūkst. gyventojų (ECDC-2010). Dauguma (33,2%) atvejų registruojama 25-34 m. amžiaus grupėje. Epidemiologinės priežiūros sistema yra tobulinama, siekiant registruoti ūminio ir lėtinio hepatito atvejus.

SIMPTOMAI

Esant ūminei ligos fazei, liga gali pasireiškti įvairiai: nuo besimptomės ar begeltės formos iki geltos ar žaibinio hepatito. Simptomai ir klinikiniai požymiai gali trukti nuo kelių savaičių iki 6 mėnesių, kurie pasireiškia gelta, tamsiu šlapimu, bendru negalavimu, nuovargiu, anoreksija, pykinimu, vėmimu ir pilvo skausmas, artralgijomis.

GYDYMAS

Šiuo metu nėra specifinio ūmaus hepatito B gydymo. Taikomas simptominis gydymas. Lėtinei hepatito B infekcijai taikomas antivirusinis gydymas.

RIZIKA

HEPATITO B KELIAMA RIZIKA

- Žaibinis hepatitas su ūmia kepenų nekroze
- Lėtinė hepatito B infekcija (Hepatito B viruso nešiojimas)
- Kepenų cirozė (15-40%)
- Kepenų vėžys
- Mirtis

GALIMA VAKCINOS PRIEŠ HEPATITĄ B KELIAMA RIZIKA

**Detali informacija apie galimus nepageidaujamus reiškinius pateikiama vakcinės informaciniame lapelyje ir specialiosiose produkto charakteristikose*

KUR GALIMA RASTI DAUGIAU INFORMACIJOS?

1. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro informacija. Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt/lt/uzkirkkelia-apsaugok-vakcinuok>
2. www.who.int
3. www.cdc.gov
4. www.vaccines.gov
5. www.vaccineinformation.org
6. www.ncirs.edu.au
7. Immunization Action Coalition (IAC): www.immunize.org/

NUORODOS

Endeminės hepatito B šalys yra pietryčių Azijos ir Ramiojo vandenyno baseino šalys (išskyrus Japoniją, Australiją ir Naująją Zelandiją), Afrika už Sacharos, Amazonės baseinas, dalis Vidurio Rytų, Centrinės Azija ir dalis Rytų Europos.



Co-funded by
the Health Programme
of the European Union