

...

HEPATITA B


FISA PENTRU ASISTENTE SI
ALTE CATEGORII DE PERSONAL MEDICAL

CE TREBUIE SĂ ȘTIU

...

EȘTI SIGUR CĂ AI LUAT TOATE MĂSURILE NECESARE
PENTRU A TE PROTEJA FAȚĂ DE HEPATITA B ?

INFORMEAZĂ-TE! VACCINEAZĂ-TE! PROTEJEAZĂ-TE!



STIA I CA?

Hepatitis B

În fiecare an aproximativ 600.000 de persoane mor ca urmare a infecției cu virusul hepatitei B (VHB)?

- VHB poate determina
- hepatită acută,
- insuficiență hepatică
- fulminantă, hepatită
- cronică, ciroză, carcinom
- hepatocelular și portaj
- (Ag HBs (+)).

- Hepatita B poate fi
- dobândită în unitățile
- medicale, în urma
- contactului cu instrumente și materiale
- contaminate cu VHB.



LA NIVEL MONDIAL

2 miliarde de persoane sunt infectate cu vhb

CÂND AM NEVOIE SA FAC SI CUM FAC UN VACCIN ÎMPOTRIVA HEPATITEI B?

VACCINUL HEPATITĂ B

•Vaccinul împotriva Hepatitei B este un vaccin ADN recombinat și se administrează intramuscular, trei doze cu schema 0 -1-6 luni.

oLa o lună sau două după cele trei doze este recomandată testarea anticorpilor anti-HBs pentru a vedea dacă s-a atins nivelul protector (>10 mUI/ml).

•Protecția oferită de vaccin este de lungă durată.



CINE ARE NEVOIE DE VACCINARE?

Personalul Medical care intră în contact cu pacienții trebuie să se vaccineze împotriva hepatitei B.

Personalul Medical care nu este vaccinat și vine în contact la locul de muncă cu materiale posibil contaminate trebuie să se vaccineze.

Orice membru al unei familii în care există un purtător de VHB.

Orice persoană care pleacă într-o țară în care Hepatita B este endemică.

Orice adult care nu are imunitate.

EFICACITATEA VACCINULUI ÎMPOTRIVA HEPATITEI B



de vaccin are o
eficacitate de 50%
în prevenirea
hepatitei;



daca sunt
administrare două
doze eficacitatea
crește la 75-80%



iar după shema
completă cu cele 3
doze protecția este de
95% pentru hepatită și
complicațiile aferente.

BOALA PE SCURT

Hepatita B este în continuare foarte frecventă în Europa și în tot restul lumii. În Europa, majoritatea cazurilor (33.2%) raportate sunt în rândul adulților tineri (grupa de vârstă 25-34 de ani).

SIMPTOME

Pacienții prezintă simptome de obicei la 30-90 de zile după expunere, unii cu simptome reduse, unii cu simptome specifice infecției ficatului, iar alții dezvoltă infecții hepatice grave. Icterul este un semn tipic, deși nu este tot timpul întâlnit. Pacienții cu hepatită B mai pot avea urină închisă la culoare, oboseală, pierderea poftei de mâncare, greață, vărsături și dureri abdominale și articulare.

TRATAMENT

Până în prezent nu există tratament care să vindece infecția acută cu Hepatită B. De obicei este necesar tratament de susținere. Noile medicamente antivirale sunt utilizate pentru infecțiile VHB cronice.

RISCURI

COMPLICAȚIILE INFECȚIEI CU VHB

- Hepatita fulminantă însoțită de necroză hepatică acută
- Purtător de VHB
- Ciroză (15-40%)
- Cancer hepatic
- Deces

RISCURILE VACCINULUI HEPATITIC B

Minore (cel mai frecvent)

- Roșeață

UNDE POT GĂSI MAI MULTE INFORMAȚII?

1. a. CNSCBT 2013. Metodologia de supraveghere a hepatitelor B și C.
http://www.insp.gov.ro/cnscbt/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=59&Itemid=10
b. Burlea M. (sub red.) – Recomandări de vaccinare în pediatrie,
Ed. Medicala Amaltea, 2012
2. www.impfen-info.de
3. www.euro.who.int: search for "immunization resources"
4. www.cdc.gov/vaccines
5. www.vaccines.gov
6. www.vaccineinformation.org
7. www.ncirs.edu.au
8. Immunization Action Coalition (IAC): www.immunize.org/



ROMTENS
foundation



Co-funded by
the Health Programme
of the European Union